
03.2001

Carduelis



Dipsacus sylvestris

De ce "Carduelis"

După luni de absenţă, vechea "Gazetă a scatiilor" apare într-o nouă formă. În acest răstimp n-au lipsit ieşirile pe teren şi studiile la masa de lucru pentru elaborarea acestui material.

De ce "Carduelis"?! Pentru că dorim ca revista noastră să aibă un mai pronunţat caracter ornitologic dar şi ştiinţific. Pentru că dorim să iniţiem un program de cercetare şi protecţie al păsărilor din familia "Fringilide", îndeosebi a celor cuprinse în acest nume : scatiul (Carduelis spinus), florintele (C. chloris), sticletele (C. carduelis), câneparul (C. cannabina), inăriţa (C. flammea)…

Pentru că dorim ca, în vremurile acestea când nu trece săptămâna fără "infracţiuni" ecologice, revista noastră să aibă un pronunţat spirit critic!

"Carduus" este numele latinesc al unor specii de spini şi ciulini – Carduus nutans, Carduus tenuiflorus, Carduus personata, Carduus acanthoides…

Nu trece o zi fără ca vecinii noştri, ori consătenii, ori pădurarii, şi/sau braconierii, ori marile combinate sau exploatări miniere, ori mari sau mici întreprinzători să nu murdărească, să nu otrăvească, să nu arunce gunoaie şi ambalaje peste tot : pe pajişti, pe malurile apelor, la marginea lacurilor, în poieni şi-n pădure, din lunci până-n piscurile munţilor cu o energie, o indiferenţă şi o încăpăţânare demne de nişte scopuri mai bune. Nu pentru mine şi pentru tine, ci pentru copiii noştri care vor vedea acvila numai în cărţi sau la T.V. Această agresivitate împotriva naturii n-are nici un înţeles… Iată de ce oferim zilnic un buchet de scaieţi celor care orbi, surzi şi nesimţitori continuă să urâţească natura, să murdărească PĂMÂNTUL!



Strix uralensis

Considerații generale asupra avifaunei din munții Rodnei


Lista cuprinde 135 de specii observate pe parcursul a 10 ani de studiu în teren. N-au fost "omologate" speciile care din diverse cauze n-au fost identificate **foarte precis !** (A. strepera, G. gallinago, T. totanus). N-au fost incluse în listă specii care există în zonă ca exemplare împăiate – nu există certitudinea unei proveniențe locale – şi nici specii din false "tratate" de vânătoare (Scolopax rusticola, Bubo bubo, Botaurus stelaris ?!!).

Din totalul speciilor listate 42 sunt sedentare, 54 sunt oaspeți de vară, 6 - oaspeți de iarnă, 10 – specii de pasaj şi 23 – specii foarte rare, accidentale. Unele specii pot fi considerate la propriu drept "rares aves" din cauză că au fost observate o singură dată pe parcursul celor 10 ani : A. purpurea, R. aquaticus, C. aeruginosus, L. ridibundus, L. cachinnans, G. passerinum, A, funereus, A. apus, R. pendulinus, C. flammea. Se pot număra pe degetele de la o mână şi notele de teren pentru alte specii rare : C. nigra, C. cyaneus, P. apivorus, A. chrysaetos, T. tetrix, P. perdix, S. uralensis, Motacilla flava, T. iliacus, Emberiza schoeniclus.

Din pricina braconajului, a distrugerii habitatelor prin exploatări forestiere intensive şi poluare cu deşeuri menajere şi rumeguş numărul speciilor clocitoare se diminuează pe zi ce trece : 102 specii la ora actuală din care o singură specie acvatică (T. ruficollis) , 3 răpitoare de zi şi şase răpitoare nocturne. În ultimii 5 ani n-au mai fost observate rața mare şi rața cârâitoare (A. platyrhynchos şi A. querquedula decât în pasaj iar unele specii au dispărut din zonă : rața mică şi găinuşa de apă (A. crecca şi G. chloropus).

Chiar şi unele specii considerate comune au devenit – din cauza obiceiului de a face din orice ochi de apă şi teren mlăştinos gropi de gunoi – "păsări exotice". În anul 1998 calendarul de observații al berzei a cuprins 19 observații, în anul 1999 doar 17 observații, iar în anul 2000, 16 observații. Barza neagră (C. nigra) a fost observată de 2 ori în aprilie 1997, de 2 ori în aprilie 1998, o singură dată (6.04.1999) şi nu avem nici o observație în 2000.

Nici viitorul altor specii nu pare mai promițător cu avalanşele de rumeguş, detergenți, gunoaie şi cianuri... Cele mai periclitate sunt răpitoarele de zi şi de noapte din pricina exploatărilor forestiere sălbatice făcute după sistemul "rade tot" . Aceste specii s-au rărit atât de mult din cauza braconajului şi a maniei de a împodobi pereții cu păsări naturalizate încât observarea unui specimen din genul "rapax" este un miracol ! Şorecarul (Buteo buteo) pasăre care altădată o vedeam pe toate gardurile a devenit specie rară!!!



Aquila chrysaetos

Din păcate în acest domeniu – a se vedea exterminarea zăganului şi a vulturului negru – avem o tristă experienţă. Dacă nu se vor lua măsuri de protecţie – care sunt infinit mai ieftine decât programele de reintroducere – vom rămâne cu o amară întrebare pe buze... "Unde sunt răpitoarele de altădată"?!!!

Speciile forestiere sunt şi ele ameninţate de vânătoarea ilegală şi distrugerea masivă a habitatului. Pădurea este hăcuită şi parcelată iar populaţiile de galinacee sălbatice tot mai dispersate sunt decimate fără milă. Podoabe vii ale munţilor noştri cocoşul de munte (T. urogallus) şi cocoşul de mesteacăn (T. tetrix) ajung trofee prăfuite în colecţiile ... moarte ale vânătorilor.

Chiar şi păsăretul de talie mică are un viitor incert. Din varii cauze s-a constatat scăderea efectivelor la populaţiile de ciocănitoare de munte (P. tridactylus), la ciocănitoarea cu spate alb (D. leucotos), la mierla gularată (T. torquatus), la sfrânciocul roşiatic (L. collurio), la pescărelul negru (C. cinclus) şi forfecuţa (L. curvirostra).

Pădurea este un organism viu – un ecosistem complex – toate etajele şi subetajele ei fiind exploatate şi valorificate la maximum, puţine specii concurând pentru aceeaşi hrană, iar dacă aceasta se întâmplă se face în sezoane şi la specii arboricole diferite.


Etajul ramurilor superioare este exploatat (la conifere) de forfecuţe şi scatii, iar la foioase de mugurari (vara) şi bodgroşi, primăvara şi toamna. Coroanele arborilor sunt explorate de specii din cele mai diverse : picidele, sitidele, paridele, turtidele, silvidele, oriolidele, corvidele şi fringilidele, găsind aici excelente locuri pentru hrană şi cuibărit. Etajul trunchiurilor este preferat de păsări din familia picide, paride, sitide şi certhide care folosesc această "nişă" atât ca spaţiu de locuit cât şi ca teritoriu de vânătoare.

Subetajul crângurilor şi al lizierelor, făgetele , molidişurile şi brădişurile tinere, alunişurile, luncile cu arin şi salcie, sunt ocupate de alte specii: pupăză (U. epops),cuc (C. canorus), capîntortură (J. torquila), codroşii de pădure, pitulicele, silvile, etc...

Alte specii preferă zonele cu rarişti, livezile sau terasele naturale cu mărăcinişuri (păducel, sorb, porumbar, măceş) şi plante (mur, zmeur) care pot constitui locuri de hrană şi cuibărit pentru mărăcinari (Saxicola torquata şi S. rubetra), măcăleandrul (E. rubecula), mierla (T. merula), ochiul boului (T. troglodytes), muscarii (Ficedula), piţigoii, presurile, sfrânciocii, o serie de fringilide.

Alte specii s-au adaptat zonelor deschise, acoperite sau nu cu vegetaţie, : fâsa de munte, ciocârliile, pietrarul sur, brumăriţa de stâncă, în timp ce altele îşi duc traiul în apropierea zonelor umede

şi mlăştinoase sau chiar la malul apelor : codobaturile (Motacilla alba şi M. cinerea), pescăruşul albastru (Alcedo atthis), pescărelul negru (C. cinclus), prundăraşul gulerat mic (C. dubius) şi fluierarul de munte (A. hypoleucos).



Strix aluco

Zona noastră prin specificul ei montan este săracă în ape stătătoare. Iazul de decantare de la Anieş (100 mp) este unul din puţinele locuri unde pot fi văzute câteva specii exotice în pasaj : barza albă şi neagră (C. ciconia şi nigra), stârcul cenuşie (A. cinerea), raţa mică (A. crecca), raţa cârâitoare (A. querquedula), fluierarul de mlaştină şi fluierarul de zăvoi (T. glareola şi T. ochropus). Singurele specii care cuibăresc aici sunt raţa mare (A. platyrhynchos) şi corcodelul mic (T. ruficollis), şi acestea tot mai mult deranjate de "traficul" pescarilor şi braconierilor din zonă.

Câteva specii s-au adaptat atât de bine cu prezenţa omului încât au ajuns să cuibărească în zonele rurale sau urbane : rândunica, lăstunul de casă, drepneaua neagră, vrabia de casă, coţofana, stăncuţa.

Există şi specii cu un larg spectru adaptativ, care pot fi întâlnite la altitudini şi în habitate diferite : cinteza, şorecarul, mierla, cocoşarul, ţicleanul, piţigoii, pănţăruşul. Altele îşi modelează (instinctual) deplasările sezoniere ori teritoriile de vânătoare în funcţie de schimbările meteo şi abundenţa hranei astfel încât la intervale regulate sau nu au loc invazii ale populaţiilor nordice : cocoşarii, mătăsarii, cioara de semănătură, scatiii, nagâţii, bodgroşii, cinteza de iarnă, în timp ce "rezervoarele avicole zonale coboară spre regiuni sudice mai calde (fringilide şi motacilide).

Peste 90% din speciile prezentate au nevoie direct sau indirect de un copac, de un zăvoi, de pădure. Chiar şi răpitoarele care vânează în câmp deschis au nevoie de copaci pentru a-şi construi cuibul (între ramuri sau scorburi) – la fel unele specii acvatice sau ciconidele. Puţine specii nu sunt legate direct de arbori – în general speciile acvatice – ele cuibărind însă mai bine şi fiind mai bine protejate de vânători şi răpitorii naturali acolo unde pe lângă vegetaţia palustră există şi specii arboricole.

Natura nu e risipitoare!! Toate resursele pădurii sunt exploatate cu maximum de randament. Chiar dacă există concurenţă pentru hrană în cadrul aceleaşi specii (picide) sau între specii aviene diferite (picide – sitide – certhite) sau cu specii din alte familii şi/sau regnuri (animale, insecte, ciuperci) pădurea oferă tuturor "cazare şi masă".

N.B. Nu există în fapt o concurenţă reală. Ca şi în cazul limicolelor care se hrănesc în zonele litorale şi păsările forestiere explorează resursele pădurii în funcţie de lungimea ciocului şi mărimea speciei.

Acolo unde există copaci păsările vor prolifera. Aceasta din cauză că păsările nu sunt decât în rare cazuri foarte strict specializate, meniul lor fiind atât vegetal cât şi insectivor sau chiar omnivor. Astfel un singur copac poate fi de-a lungul vieţii lui (de la lăstar la trunchi viguros până la scorbură şi putregai) sursa de hrană, refugiu şi loc de cuibărit pentru zeci de specii.

Fire nevăzute leagă păsările de celelalte vieţuitoare ale pădurii, de plante, de insecte, de fructele pădurii şi de ciuperci, de sursele de apă şi chiar de arborii morţii. **Pădurea este casa lor! Să păstrăm nealterate farmecul şi bogăţiile ei.**

N.B. Această categorisire a speciilor pe microhabitate şi nişe ecologice s-a făcut doar din considerente teoretice şi din necesitate unui studiu schematic al habitatelor din zonă. În realitate lucrurile privind conexiunile şi interconexiunile dintre păsări, speciile animale, fauna entomologică şi herpetologică, regnul vegetal, au un caracter atât de complex încât deseori nu pot fi cuprinse în înţelegerea noastră.



Asio otus

Aspecte privind statutul unor specii

S = sp. sedentară

Ov = oaspete de vară

Oi = oaspete de iarnă


P = sp. în pasaj

Ra = sp. rară (accidentală)

Consider această clasificare arbitrară şi puţin forţată. Etologia, ecologia şi migraţia păsărilor au un caracter mult mai complex depinzând de o multitudine de factori – unii încă necunoscuţi - : clima şi situaţia meteo, formele de relief şi curenţii de aer, habitatul, viabilitatea şi adaptabilitatea unor specii, oportunitatea la condiţiile climatice şi de hrană dintr-o zonă. Există specii parţial migratoare, care execută deplasări spre zone sudice mai calde în fiecare an, altele care fac migraţii de scurt parcurs doar în iernile foarte aspre. La unele specii migrează doar femelele şi exemplarele tinere, masculii rămânând pe loc sau plecând mult mai târziu.

Sosirea oaspeţilor de iarnă este dictată de condiţiile meteo, dar şi de cantitatea de hrană din locurile de baştină. "Par exemple" scatiii au sosit din nord pe 10 octombrie (1999) şi 25 octombrie (2000), plecând în general până la sfârşitul lui februarie. Şorecarul încălţat (B. lagopus) poate fi observat de obicei în ianuarie, cinteza de iarnă (F. montifringilla) şi brumărița de stâncă (P. collaris) în timpul ninsorilor din februar. Mătăsarii (B. garrulus) ne-au fost oaspeţi mult aşteptaţi; sosirea lor a fost semnalată chiar a doua zi de Crăciun (26.12) , ei fiind apoi salutaţi şi observaţi în 30 decembrie, 5 ianuarie, 4 şi 17 februarie 2001.

Piţigoiul mare sau cărbunar (P. major) poate fi văzut în orice zi a anului ca şi vrăbiuţa de casă (P. domesticus), în timp ce altele se arată "zgârcite" ca prezenţă şi pentru un localnic pot fi văzute o singură dată în viaţă : stârcul roşu (A. cinerea), cocoşul de mesteacăn (T. tetrix), pescăruşul râzător (L. ridibundus), ciuvica (G. passerinum), boicuşul (R. pendulinus)!!



Carduelis carduelis

O listă deloc exhaustivă care să cuprindă speciile observate de cel puţin 10 ori într-un an s-ar reduce la jumătate, adică vreo 70 de specii aşa zis comune. Din acest număr doar 3 reprezintă răpitoarele de zi (B. buteo, A. nisus şi gentilis) , în dreptul răpitoarelor de noapte având un **mare zero**! Bineînţeles speciile sedentare şi o parte din oaspeţii de vară sunt înaripatele cele mai des întâlnite.

La noi, în zona montană, pot fi considerate specii parţial migratoare câteva fringilide : cinteza (F. coelebs) , sticletele (C. carduelis), florintele (C. chloris), câneparul (C. cannabina), dar şi mierla (T. merula) şi presura galbenă (E. citrinella). Aceste specii au fost observate în cursul iernii anului 2000, iarnă care a fost extrem de blândă. Nu ştim însă dacă a fost vorba de populaţiile aviene locale sau de stoluri venite din nord. În anii obişnuiţi din punct de vedere climatic speciile de mai sus sunt primii oaspeţi de vară. La acest prim val se pot adăuga : măcăleandrul (E. rubecula), ciocârliile (A. arvensis şi L. arborea), graurii (S. vulgaris) urmate de codobaturile albe şi de munte (M. alba şi cinerea), de codroşii de pădure (P. ochruros) şi de mărăcinarii negrii (S. torquata). În al doilea val spre începutul lui aprilie trec berzele (Ciconia), raţele mari şi cele cârâitoare în pasaj, sosesc primele pupeze, pitulicele, sturzii cântăreţi, codroşii de pădure, şorecarii, fâsa de munte (A. spinoletta) şi brumărița de pădure (P. modularis). Tot acum pot fi văzute şi câteva specii de pasaj (vezi lista), în timp ce scatiii se întorc în nord pe firul apei în sus, din arin în arin. La mijlocul lui prier sosesc rândunelele – dar asta depinde foarte mult de condiţiile de timp locale. În calendarul lui 1999 prima rândunică a fost observată în 30 martie, în 2000 abia în 17 aprilie, iar în 2001 în 2 aprilie. Urmează apoi lăstunii de casă, pietrarii, silviile, mărăcinarii mari, muscarii, mierla de piatră, iar spre sfârşitul lunii cucii şi grangurii. Ultimul sosit este sfrânciocul roşcat (L. collurio).



Ştiri ornitologice


- A apărut "**ALCEDO**" – 14-15 un număr de sărbătoare. Printre alte articole din cuprins citiţi "S.O.S." – Specii ameninţate (I. Hoza);
- Am primit "La gazette des terriers" no. 96. Atenţie!! Începe campania "2001 Odiseea lăstunilor şi a rândunelelor". Federaţia C.P.N. din Franţa ne pune la îndemână "o grămadă" de documente;
- O grupă de scatii participă la programele naţionale de monitorizare a păsărilor : "Sincron", "Birtwatch", "Recesământul păsărilor acvatice" şi "Lanius" – un program de ultimă oră!

Lista păsărilor din zona bazinului hidrografic Anieş

1	Corcodel mic	Grebe castagneux	Tachybaptus ruficollis	Ov
2	Stârc de noapte	Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax	Ra
3	Stârc cenuşiu	Heron cendre	Ardea cinerea	P
4	Stârc roşu	Heron pourpre	Ardea purpurea	Ra
5	Barza albă	Cigogne blanche	Ciconia ciconia	P
6	Barza neagră	Cigogne noire	Ciconia nigra	Ra
7	Rața mare	Canard colvert	Anas platyrhynchos	Ov
8	Rața mică	Sarcelle d'hiver	Anas crecca	P
9	Rața cârâitoare	Sarcelle d'ete	Anas querquedula	P
10	Erete de stuf	Busard des rosseaux	Circus aeruginosus	Ra
11	Erete vânat	Busard St.Martin	Circus cyaneus	Ra
12	Şorecar comun	Buse variable	Buteo buteo	Ov
13	Şorecar încălțat	Buse pattue	Buteo lagopus	Oi
14	Viespar	Bondre apivore	Pernis apivorus	Ra
15	Uliu păsărar	Epervier d Europe	Accipiter nisus	S
16	Uliu porumbar	Autour des palombes	Accipiter gentilis	S
17	Acvila de munte	Aigle royal	Aquila chrysaetos	Ra
18	Vânturel roşu	Faucon crecerelle	Falco tinnunculus	Ov
19	Şoim călător	Faucon pelerin	Falco pelegrinus	Ra
20	Şoimul rândunelelor	Faucon hobereau	Falco subbuteo	Ov
21	Cocoş de munte	Grand tetras	Tetrao uragallus	S
22	Cocoş de mesteacăn	Tetras lyre	Tetrao tetrix	S
23	Ieruncă	Gelinotte des bois	Bonasa bonasia	S
24	Potârniche	Perdrix grise	Perdix perdix	Ra
25	Crâstei de baltă	Rale d'eau	Rallus aquaticus	Ra
26	Găinuşa de baltă	Poule d'eau	Gallinula chloropus	Ra
27	Nagâț	Vanneau huppe	Vanellus vanellus	P
28	Fluierar de munte	Chevalier guignette	Actitis hypoleucos	Ov
29	Fluierar de mlaştină	Chevalier sylvain	Tringa glareola	P
30	Fluierar de zăvoi	Chevalier culblanc	Tringa ochropus	P
31	Pescăruş râzător	Mouette rieuse	Larus ridibundus	Ra
32	Pescăruş argintiu	Goeland leucophee	Larus cachinnans	Ra
33	Porumbel gulerat	Pigeon ramier	Columba palumbus	Ov
34	Porumbel de scorbură	Pigeon colombin	Columba oenas	Ov
35	Turturică	Tourterelle des bois	Streptopelia turtur	Ov
36	Guguştiuc	Tourterelle turque	Streptopelia decaocto	S
37	Ciuş	Petit – duc scops	Otus scops	Ov
38	Ciuvica	Chevechette d'Europe	Glaucidium passerinum	Ra
39	Cucuvea	Cheveche d'Athena	Athene noctua	S
40	Minunița	Nyctale de Tengmalm	Aegolius funereus	Ra
41	Huhurez mare	Choutte de l'Oural	Strix uralensis	Ra
42	Ciuf de pădure	Hibou moyen - duc	Asio otus	Ra
43	Huhurez mic	Chouette - hulotte	Strix aluco	Ra
44	Pescăraş albastru	Martin pecheur	Alcedo atthis	P
45	Pupăza	Huppe fasciee	Upupa epops	Ov
46	Cuc	Coucou gris	Cuculus canorus	Ov

47	Ciocănitoare mare	Pic epeiche	Dendrocopos major	S
48	Ciocănitoare de grădini	Pic syriaque	Dendrocopos syriacus	S
49	Ciocănitoare de stejar	Pic mar	Dendrocopos medius	S
50	Ciocănitoare cu spate alb	Pic a dos blanc	Dendrocopos leucotos	S
51	Ciocănitoare de munte	Pic tridactyle	Picoites tridactylus	S
52	Ciocănitoare neagră	Pic noir	Dryocopus martius	S
53	Capîntortură	Torcol fourmilier	Jynx torquilla	Ov
54	Ghionoaie verde	Pic vert	Picus viridis	S
55	Ghionoaie sură	Pic cendre	Picus canus	S
56	Ciocârlie de câmp	Aluoette des champs	Alauda arvensis	Ov
57	Ciocârlie de pădure	Aluoette lulu	Lullula arborea	Ov
58	Drepnea neagră	Martinet noir	Apus apus	Ra
59	Rândunica	Hirondelle rustique	Hirundo rustica	Ov
60	Lăstun de casă	Hirondelle des fenetre	Delichon urbica	Ov
61	Fâsă de pădure	Pipit des arbres	Anthus trivialis	Ov
62	Fâsă de luncă	Pipit farlouse	Anthus pratensis	Ov
63	Fâsă de munte	Pipit spioncelle	Anthus spinoletta	Ov
64	Codobatură albă	Bergeronnette grise	Motacilla alba	Ov
65	Codobatură de munte	Bergeronnette des ruis	Motacilla cinerea	Ov
66	Codobatură cu cap galben	Bergeronnette printan.	Motacilla flava	Ra
67	Pietrar sur	Traquet motteux	Oenanthe oenanthe	Ov
68	Mărăcinar negru	Tarier patre	Saxicola torquata	Ov
69	Mărăcinar mare	Tarier des pres	Saxicola rubetra	Ov
70	Măcăleandru	Rougegorge	Erithacus rubecula	Ov
71	Codroş de pădure	Rougeq. a front blanc	Phoenicurus phoenic.	Ov
72	Codroş de munte	Rougequeue noir	Phoenicurus ochruros	Ov
73	Mierlă de piatră	Merle de roche	Monticola saxatalis	Ov
74	Mierlă	Merle noir	Turdus merula	Ov
75	Mierlă guleratâ	Merle a plastron	Turdus torquatus	Ov
76	Cocoşar	Grive litorne	Turdus pilaris	S
77	Sturz cântăreţ	Grive musicienne	Turdus philomelos	Ov
78	Sturz de vâsc	Grive draine	Turdus discivorus	Ov
79	Sturz de vii	Grive mauvis	Turdus iliacus	Ra
80	Silvie cu cap negru	Fauvette a tete noir	Sylvia atricapilla	Ov
81	Silvie de câmp	Fauvette grisette	Sylvia communis	Ov
82	Silvie mică	Fauvette babillarde	Sylvia curruca	Ov
83	Silvie porumbacă	Fauvette eperviere	Sylvia nisoria	Ov
84	Pitulice mică	Pouillot veloce	Phylloscopus collybita	Ov
85	Pitulice fluierătoare	Pouillot fitis	Phylloscopus trochilus	Ov
86	Pitulice sfârâitoare	Pouillot siffleur	Phylloscopus sibilatrix	Ov
87	Auşel cu cap galben	Roitelet huppe	Regulus regulus	S
88	Auşel sprâncenat	Roitelet triplebandeau	Regulus ignicapilus	S
89	Pescărel negru	Cincle plongeur	Cinclus cinclus	S
90	Ochiuboului	Troglodyte mignon	Troglodytes troglodytes	S
91	Cojoaica de pădure	Grinpereau des bois	Certhia familiaris	S
92	Cojoaica cu degete scurte	Grinpereau des jardins	Certhia brachydactyla	S
93	Ţiclean	Sittelle torchepot	Sitta europaea	S
94	Muscar negru	Gobemouche noir	Ficedula hypoleuca	Ov
95	Muscar gulerat	Gobemouche a collier	Ficedula albicollis	Ov
96	Muscar sur	Gobemouche gris	Muscicapa striata	Ov


97	Muscar mic	Gobemouche nain	Ficedula parva	Ov
98	Mătăsar	Jaseur boreal	Bombycilla garrulus	Oi
99	Sfrâncioc roşiatic	Pie–grieche ecorcheur	Lanius collurio	Ov
100	Sfrâncioc mare	Pie–grieche grise	Lanius excubitor	S
101	Piţigoi mare	Mesange charbonniere	Parus major	S
102	Piţigoi de brădet	Mesange noire	Parus ater	S
103	Piţigoi albastru	Mesange bleue	Parus caeruleus	S
104	Piţigoi sur	Mesange nonnette	Parus palustris	S
105	Piţigoi de munte	Mesange boreale	Parus montanus	S
106	Piţigoi moţat	Mesange huppee	Parus cristatus	S
107	Piţigoi codat	Mes. a longue queue	Aegithalos caudatus	S
108	Boicuş	Remiz penduline	Remis pendulinus	Ra
109	Coţofană	Pie bavarde	Pica pica	S
110	Alunar	Cassenoix mouchete	Nucifraga caryocatactes	S
111	Gaiţă	Geai des chenes	Garrulus glandarius	S
112	Grangur	L'oriot d'Europe	Oriolus oriolus	Ov
113	Graur	Etourneau sansonet	Sturnus vulgaris	Ov
114	Stăncuţă	Choucas des tours	Corvus monedula	S
115	Cioara grivă	Corneille mantelee	Corvus corone cornix	S
116	Cioara de semănătură	Corbeau freux	Corvus frugilegus	Oi
117	Corb	Grand corbeau	Corvus corax	S
118	Botgros	Grosbec	Coccothraustes c.	S
119	Cinteza	Pinson des arbres	Fringilla coelebs	Ov
120	Cinteza de iarnă	Pinson du Nord	Fringilla montifringilla	Oi
121	Sticlete	Chardonneret	Carduelis carduelis	Ov
122	Florinte	Verdier d'Europe	Carduelis chloris	Ov
123	Scatiu	Tarin des aulnes	Carduelis spinus	Oi
124	Cănăraş	Serin cini	Serinus serinus	Ov
125	Mugurar	Bouvreuil pivoine	Pyrrhula pyrrhula	S
126	Cânepar	Linotte melodieuse	Carduelis cannabina	Ov
127	Inariţa	Sizerin flamme	Carduelis flammea	Oi
128	Forfecuţa	Becroise commun	Loxia curvirostra	S
129	Vrabia de casă	Moineau domestique	Passer domesticus	S
130	Vrabia de câmp	Moineau friquet	Passer montanus	S
131	Brumărita de pădure	Accenteur mouchet	Prunella modularis	Ov
132	Brumărita de stâncă	Accenteur alpin	Punella collaris	Oi
133	Presura de stuf	Bruant des rosseaux	Emberiza schoeniclus	Ra
134	Presura de munte	Bruant fou	Emberiza cia	Ov
135	Presura galbenă	Bruant jaune	Emberiza citrinella	S



N.B.

- Lista rămâne deschisă;

- Lista a fost deja îmbunătăţită cu încă 3 specii observate la noi : rata cu cap castaniu (A. fuligula), sfrânciocul cu frunte neagră (L. minor) şi lăstunul de mal (R. riparia).




Observaţii ornitologice

Doi remarcabili oaspeţi de iarnă

Mătăsarii (B: garrulus) sunt păsări nordice de dimensiunile graurului, cu moţ pe ceafă. Cuibăreşte în pădurile de mesteceni şi conifere din nordul Europei. În anii când "producţia" de fructe şi bobiţe este slabă ei pornesc în invazii spre zonele sudice. Un stol de 30 exemplare a fost observat pe Dealul Poienii (26.12) în locul "La cruce". În 30 decembrie au fost observate 3 exemplare în zbor, un stol mai mic de 15 exemplare în 5.01. , un exemplar solitar în 4.02. aşezat pe un tufiş de măceş mâncând zăpada (?!) de pe crengi. Un stol de 12 exemplare a fost observat în 17.02. de data aceasta prin mărăcinişurile din Dosul Anieşului.

Brumărița de stâncă (P. collaris) a fost semnalată încă din iarna anului trecut de un harnic coleg de teren, deja expert într-ale ornitologiei, elevul Dorel Bazga. Este o pasăre cu penaj modest (asemănător cu al brumăriţei de pădure), de mărimea unei ciocârlii cu care seamănă şi la cântec. Cuibăreşte deasupra limitei superioare a pădurilor, pe platouri montane la mare altitudine. A fost observată în cariera de piatră Poiana Ilvei la începutul lui februarie (4.02.) pe ninsoare de zile mari.



Mulţumiri generoşilor sponsori care ne-au ajutat să multiplicăm această revistă :

- D-lui ing. Jauca Alexandru – Ocolul Silvic Rodna;
- D-lui dir.adj. Berende Toader –Grupul Şcolar Maieru;
- D-lui ing. Berende Damaschin.

Mulţumiri pentru ilustraţii : "La Hulotte" – "Oiseaux " (autocolants) e "Usborne" – "Guide oiseaux d'Europe " (Peterson)

Tehnoredactare computerizată : ing. Dumitru Valer.

Redactori : înv. Hoza Ilie şi elevii : Hoza Aurelian, Bazga Dorel, Szekely Daniel, Hădărău Ionică.