Carduelis

Revue naturaliste du club ornitho – roumain Les Tarins Anieş

Sucursale de la Societe Ornithologique Roumaine



Calendrier des tarins

Dates et efectivs

20. 10 1998 - 23. 02 1999 = 17 obs ~ 650 ind
06 10 1999 - 20 02 2000 = 26 obs ~ 570 ind
25 10 2000 – 08 03 2001 = 32 obs ~ 1220 ind
03 10 2001 – 27 04 2002 = 27 obs ~ 850 ind
02 10 2002 – 20 03 2003 = 30 obs ~ 1000 ind

TARIN DES AULNES

Carduelis spinus

Famille :
Fringillidés
Longueur :
12 centimètres
Lieu de vie :
Bois de conifères et aulnes, dans les massifs montagneux.
Mode de vie :
Migrateurs en France, Suisse, Belgique d'octobre à avril.
Alimentation :
Graines d'aulne, de bouleau, d'orme, de plantes herbacées et insectes (au printemps).
Période de reproduction :
Avril-juin
Nombre d'oeufs pondus :
Deux couvées de 3 à 5 oeufs.
Durée de l'élevage des jeunes :
14 jours
Caractéristiques :
Plumage vert-jaune, noir sur le dos et les flancs.

Tarin des aulnes - *Carduelis spinus*


carspii.htmlcarspii.html
Serge Sorbi - AVES

Petit oiseau bien connu des amateurs d'oiseaux de cage, le Tarin mâle a une calotte et une petite bavette noire, une poitrine jaune et un dos verdâtre rayé de noir. La femelle, plus terne, a la tête comme le reste du dessus et la poitrine blanche striée.

Le "sizet" est un visiteur de passage, parfois hivernant et fréquentant alors principalement les aulnes, les bouleaux et les mangeoires. Son abondance est assez variable et dépend probablement de la quantité de nourriture disponible plus au Nord et à l'Est.
Généralement présent en Hesbaye d'octobre à mars, c'est un oiseau sociable et peu farouche qui peut nicher en Ardenne.

Ordre : Passériformes **Famille : Fringillidés**

Encyclopédie Accueil



le tarin des aulnes

Références Légende


Recherche de sites web

Le tarin des aulnes (Carduelis spinus) appartient à la famille des fringillidés (ordre des passériformes). Long de 12 cm environ, il est verdâtre, avec, chez le mâle, une calotte et un menton noirs. Assez fréquent en France pendant la mauvaise saison, il niche en petit nombre dans nos montagnes. Il fréquente les forêts mixtes ou les forêts de conifères; en hiver, il se réunit en groupes et descend vers les plaines, souvent au bord des cours d'eau. Son chant est gracieux, quoique pas particulièrement mélodieux, et il le lance du haut des hautes branches des arbres ou même en

vol. À partir de la mi-avril jusqu'à juin, il pond, une ou deux fois, de 4 à 6 œufs bleuâtres tachés de rouge pâle, dans un nid en forme de coupe, dissimulé dans un conifère

fiche_oiseau.htmlfiche_oiseau.html

Le tarin des aulnes



Photos de Raymonde Le Reste - mâle


Nom Scientifique : Carduelis spinus
Nom breton : Tarin
Nom anglais : Siskin
Taille : 11 à 12 cm
Famille : Fringillidés

Ces jolis oiseaux parent de leur plumage jaune vif les ramures dépouillées des arbres en prenant des poses acrobatiques pour atteindre les chatons situés à l'extrémité des branches.
Tout au long du jour, l'activité incessante des Tarins le laisse guère de place au repos. De temps en temps ils descendent à terre pour picorer les semences tombées, sautillent jusqu'au bord d'une flaque ou d'un ruisseau pour y boire et s'y baigner, puis regagnent vite les branches pour y faire toilette.


Le mâle adulte a une calotte noire, une petite bavette noire d'étendue variable au menton, le dessus vert jaunâtre finement rayé de noir, le croupion jaune verdâtre uni, le côté de la tête jaune verdâtre, ainsi que la gorge et la poitrine, le ventre blanc grisâtre, les flancs rayés de noir.
Le bec est gris ou brunâtre, les pattes gris à brun foncé, l'iris brun noir ou gris foncé.
La femelle est plus terne et n'a pas de noir à la tête.

Le cri habituel est un *tli-u* ou *tsî-e* fin et plaintif, souvent émis en vol; les groupes occupés à se nourrir émettent aussi un gazouillis sec et bas.
Le chant est une série de phrases gazouillées ondulant doucement et se terminant par un *chèiii* nasillard.

Assez commun, il niche dans les forêts de conifères



et mixtes, avec une préférence pour les épicéas. En dehors de la période de reproduction, il affectionne les bouleaux et les aulnes le long des cours d'eau; localement il visite les jardins. Au passage de printemps, il apprécie les ormes ou les frênes dont il consomme les inflorescences.



Le nid du Tarin est très petit, en forme de coupe profonde, solide et soigné, composé de ramilles sèches, de lichens, de mousse, avec une garniture intérieure de radicelles, de crins, de cocons, de plumes. Comme il est en général situé vers l'extrémité d'une branche latérale de conifère, dissimulé parmi les aiguilles serrées, à une grande hauteur de surcroît, il est fort malaisé de le voir.
La ponte a lieu en avril-juin, 3 à 5 oeufs, couvés par la femelle durant 13 jours, nourrie par le mâle à intervalles assez longs. Elle nourrit d'abord seule les jeunes, puis les deux participent, par régurgitation.
Les petits s'envolent à 17 jours et sont vite indépendants, se rassemblant en troupes errantes.
La migration débute mi-septembre et atteint son point culminant en octobre.




Pendant la majeure partie de l'année, les Tarins sont granivores. En plus des aulnes, les conifères, et surtout les sapins, jouent un grand rôle dans leur alimentation.
Son bec aigu est d'ailleurs parfaitement adapté à l'extraction des graines des cônes. Le bouleau et l'orme sont aussi visités, de même qu'une quantité de plantes (chardons, pissenlits...) au moment de la maturité des graines.
Les jeunes sont d'abord nourris d'insectes (chenilles et pucerons).

AULNE, ATTENTION , VOILA LES TARINS!

Dès les premiers jours d'automne, commence l'invasion des tarins, les dévastateurs de strobiles (voir page 13): leurs bataillons déferlent du Grand Nord (Suède, Russie, Pologne etc...). Ces petites boules de plumes, pesant à peine 12 grammes, vont s'abattre sur nos amis les aulnes, pour en dévorer les graines. Après un long voyage de près de 1500 km, ces petits acrobates débordent d'énergie et adorent se pendre aux strobiles la tête en bas.

Le tarin des aulnes fait partie de la famille des FRINGILLIDES comme le pinson, le verdier, le bouvreuil. Tous sont granivores (ils mangent des graines): leur bec gros et cônique (de la forme d'un cône) est adapté à leur alimentation. Le mâle est jaune verdâtre rayé de noir; la femelle est moins colorée. Signe particulier de Monsieur: une barbichette noire. Si vous vous promenez, en hiver, au bord de l'eau, n' oubliez pas vos jumelles: vous pourriez confondre les tarins avec le moineau ou le verdier; ouvrez bien vos oreilles car nos petits tarins sont très bavards!...



CPN
Les Tarins
Roumanie

Chroniques Ornithologiques



- 10 12 '01 Prgramme Wetlands
  - 33 especes ~2600 ind.
  - 6 rapaces diurnes :le baron gri, busard St-Martin (*Circus cyaneus*).
  - Autres especes : Canard colvert, Martin pecheur, pic epeichette, tarins, jaseur boreal, bruant fou.
- 1 28 '02 Programme Sincron (Monitoriser les oiseaux a la mangeoire)
  - 33 especes ~3028 ind.
  - Mesanges charbonnieres (*Parus major*) ~957 ind.
  - Faucon emerillon (*Falco columbarius*) 1 ind 10 02 (*Coche!*)
- 1 31 '03 Programme Sincron sur terrain
  - 45 especes plus de 5000ind
  - le premier vague de migration: chardonnerets, merles, etourneaux, vanneaux huppes, linottes.
  - Belles nouvelles de la famille « Rapax »: aigle roial (2 ind – 9 03), faucon pelerin (1 ind- 18 03, 28 03), cheveche d' Athena (1 ind / 30 03).
  - Belcri de la part de pic noir (1 ind – 12 02) pour la Hulotte no.82!!
  - Passage d' un oiseau mister… butos etoile (*Botausus stelaris*) 1 ind – 8 03, 23 03
  - Arrive d' autres hotes d' ete : bergeronnettes (*M. alba & cinerea*), la famille de grives (grive mauvis *Turdus iliacus* – 3 ind 23 03), les tariers patries, les rouge gorge, les rougequeues.

Bibliographie:

Ghidul Hamlyn – Dan Munteanu, Revista Pic Noir – Fourmies Fr., La Hulotte, Agenda des Tarins

Remerciements: SOR Cluj / Agnes Piette CPN Pic Noir Fr. / La Hulotte (Images) * Sponsor: SC LUMIDAN Rodna, Patron Damaschin Berende

Equipe de radaction: Ilie Hoza, Aurelian Hoza, Dorel Bazga, Daniel Szekeli.

Travail sur ordinateur: Mircea Croitor Jr., Nelu Deac.

Adrese: Clubul Ornitologic CPN Scatiii Anieş – Sucursală a SOR şi club afiliat Federaţiei franceze a cluburilor CPN.