LE CLUB ORNITHO-ROUMAIN LES TARINS

C.P.N.


GAZETA SCATIILOR

oct. 98/ nr. 16.



« Les oiseaux de même plumage s' assemblent sur même rivage »

-manifest naturalist al clubului C.P.N. SCATII'



Acest nr. al gazetei noastre se vrea un manifest intru protecția unor făpturi îndelung ocărîte, discreditate și calomniate pe nedrept, ucise și țintuite pe portile hambarelor (a se vedea dosul cucuvelei), strivite în picioare, rău omorîte cu bîta și cuțitul ca în cazul broaștelor și liliecilor. Ptr. unii, liliacul mai este încă un monstru care suge sîngele copiilor ozu se agață în părul femeilor, cucuveaua, o pasăre a nenorocirii, strigătul ei în apropierea casei fiind asociat cu prevestirea morții, iar broasca ... este cel mai nefericit dintre tóate animalele bestiarelor. În zorii mileniului III, sîntem încă în Evul Mediu! Singurul adevăr este acela că despre aceste vietuitoare se mai colporteză o mulțime de stupidități!



Calendar...



Octombrie

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Vânătoare: bizam, capră neagră, căprior (femelă), cerb comun, cerb lopătar, câine enot, dihori, hermelină, jderi, mistreț, muflon, nevăstuică, nurcă americană, nutrie, râs, șacal, veveriță, viezure, vulpe, bătăuș, becaține, ciori, ciocârlan, cormoran mare, cotofană, eider, fazan, ferestraș, gaiță, găinușă de baltă, gâște, grauri, guguștiuc, ieruncă, lișiță, nagât, porumbei, prepeliță, rațe, sitari, stăncuță, sturzi, stârc cenușiu, turturică, tigănuș, până la 15.X. – marmotă; de la 15.X –potârniche.
Pescuit: rezultate mai slabe la peștii pașnici, pe măsura răcirii apelor; peștii răpitori – în special știuca – mușcă la năluci și pește viu.

Noiembrie

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Vânătoare: bizam, capră neagră, căprior (femelă), cerb comun, cerb lopătar, câine enot, dihori, hermelină, iepuri, jderi, mistreț, muflon, nevăstuică, nurcă americană, nutrie, râs, șacal, veveriță, viezure, vulpe, bătăuș, becaține, ciori, ciocârlan, cormoran mare, cotofană, eider, fazan, ferestraș, gaiță, găinușă de baltă, gâște, grauri, guguștiuc, ieruncă, lișiță, nagât, porumbei, potârniche, rațe, sitari, stăncuță, sturzi, stârc cenușiu, turturică, tigănuș: până la 15.XI - prepeliță.
Pescuit: rezultate tot mai slabe la peștii pașnici; se obțin unele rezultate la peștii răpitori (știucă, șalău, biban și avat).

cu zile negre

Dragi vînători, stimați braconieri,

Fiți gata! Pregătiți-vă muniție, pușile și cățeanele. Jos inimile! Înăcriți-vă sufletele!! Fiți mîniosi. Supărați-vă pe tot ce vă iese în cale! Exterminați toate zburătoarele! Spulberați toate patrupedele! Otrăviți toate apele cu furie voastră! Liste e lungă ca cea cu șerpi scrîș-



nită sub șenile și nu vă îndepărtați de la acest teleucigaș decît atunci cînd toate armele folosite în războiul contra NATURii vor fi tocite și ruginite (Ba nici atunci!); cînd din sufletul vostru va picura încet cîte-un pic de fiere, iar pe pereți se vor aduna tot mai multe carcase împăiate! ~ scrisoare din partea A.X.A. (asoc. de exterminare...)












Calendar ... viu



~ din ce în ce mai viu ! ~

Răsfoim filele agendei noastre naturaliste ... și reîntîlnim în fiecare zi, prietenii noștri înaripați, neobosiți și neîntristați: pitigoii (Parus), cintezoii (Fringila coelebs), sticleții (Carduelis carduelis), mierlele (Turdus merula) alunarii (Nucifraga caryocatactes), gaițele (G. Glandarius) cotofenele Pica, botgrosii cu ciudățul lor nume latinesc - Coccothraustes coccothraustes!; cocarzii (T. pilaris) dar și prieteni mai rari, cum ar fi aceeași ... soră mijlocie din neamul ciocănitorilor numită ... Dendrocopos medius ...





Adică ... eu ?!


- Și ... tocmai eți asistat la o conversație despre cursul de latină!

Iar cu Pice pice ... Ce ți-e și cu latinească asta ?!


... Cu prietenii noștri acvatici ne-am reîntîlnit la iaz și în cîteva mocirle: broscuța cu burtă galbenă (Bombina variegata) și broasca roșcată de pădure (Rana temporaria) și un triton (Triturus vulgaris). Celelalte rude ale lor s-au cam dat la ... adînc dar îi vom reîntîlni în martie viitor. Tot în aceste locuri cu apă vie am observat cîteva odonate (adică libelule) din genul Sympetrum: S. danae și S. depressiusculum.



... Apoi timpul s-a înrăutățit ... u, u. uuu ! a venit și frigul, și zăpada vine tot mai aproape ~ ... dar parcă nici zăpezile ~ nu mai sînt ca altădată (vorba lui Villon - dacă-l cunoașteți) și începem să ne gîndim la ... cantinele ptr. păsărele.



CUCUVEAUA



≈ Buletin de identitate ≈

Familia: STRIGIDELOR ~ cea mai diurnă dintre răpitoarele noastre de noapte

Nume latinesc: Athene noctua

Talie: 21 cm.

Greutate: 170 grame

Anvergură: 60 cm.

1. Identificare:

Această pasăre de talie modestă, prezintă o siluetă caracteristică, scurtă și îndesată. Capul mare și aplatizat, cu fruntea joasă, mărginită de sprâncene albicioase sub care strălucesc ochii mari, galbeni îi dau un aer încruntat și sever. Spatele brun-roscat este picurat cu alb, în timp ce burta și flancurile de-un alb-gălbui sînt brăzdate de pete cafenii. Ciocul este galben-verzui iar picioarele (tarsul) învelite cu puf alb, sînt înarmate cu gheare negricioase.


2. Domiciliu



Simpatica noastră cunoștință locuiește la ... țară. Locurile ei preferate sînt livezile cu pomi bătrîni și hățișurile cu sălcii scorburoase. Preocupată fiind cu prinderea micilor rozătoare, cucuveaua nu-și construiește un cuib propriu-zis ci depune ouăle într-o cavitate: o scorbură, scobitura unui zid, în despicătura unei stînci etc.

3. Regim alimentar

Înțeleapta noastră prietenă, vînează stînd la pîndă, seara sau dis-de-dimineață, insecte mari (de preferință lăcuste verzi), mici rozătoare (șoricei și chițcani), rîme și larve diverse.



Grands consommateurs de petits rongeurs et d'insectes dont ils régulent les populations, les chouettes et les hiboux se situent au sommet de la chaîne alimentaire.

Malheureusement, bien des menaces pèsent sur ces indispensables prédateurs !

Photo Jean-Claude GENOT



- În fiecare iarnă trebuie să se controleze soliditatea și etanșeitatea căsuței și să se înlocuiască 'petul de rumegus.

- colivia nu trebuie să fie cu nici un chip vizitată în timpul depunerii ouălelor sau în timpul clocitului, adică între sfîrșitul lui martie și jumătatea lunii iunie.

- nici după această perioadă, familia nu trebuie vizitată prea des ; cel mult o dată pe săptămînă, la căderea nopții, pe timp frumos.

- observațiile, la o distanță rezonabilă de cuib, cu ajutorul binoclului sau telescopului, se pot face tot timpul anului. Făcînd dovadă de cea mai mare discreție, veți putea vedea dute-vino-ul adulților, ori poate chiar să asistați la paradele nuptiale ... ori la prima ieșire a ... ghemelor de scamă ... Succes!




În cuib (fie el natural sau artificial) femele cucuvaie clocește 25-30 zile; cei 3-5 pui care au norocul să supraviețuiască, părăsesc cuibul după vreo 39 de zile, dar nu vor fi capabili să zboare decît la capătul a 45 de zile.

Voce - Destul de greu de pus pe note... un fel de hu-u! hu-uu! sau hui-iu hui-iuu dar și un fel de schelălăit: chiu-iu! chiu-iu! și 'dip-dip-dip; puii deranjați la cuib emit fînd un șîșîit puternic: sss-șîș-șîșss!

Durata vieții - Din ce în ce mai scurtă, datorită pesticidelor sau prăzilor otrăvite, circulației rutiere, prădătorilor naturali sau domestici, distrugerea biotopurilor (vezi desenul!)

Les causes de la régression



Semne particulare: Simbol al Atenei, zeița înțelepciunii și a războiului la greci; deși nocturnă vînează mai mult ziua (seara și dimineața); ochii de aur; temenele nervoase în caz de pericol.

Specie din ce în ce mai rară; protejată dar...

LA CHOUETTE-CHEVECHE

En avril, nous sommes allés à Etroeungt, pour voir l'habitat de la Chouette chevêche.

La Chouette chevêche, la chouette aux yeux d'or, niche dans le bocage, principalement dans les pommiers et les saules-têtards.

Nous avons découvert que de nombreux dangers la menacent :


-Les fils barbelés qui remplacent de plus en plus souvent les haies,
-Les voitures qui roulent trop vite,
-Les hommes qui lui suppriment son habitat et sa nourriture, en arrachant les arbres morts et les haies qui abritent tant de petits rongeurs et d'insectes qui constituent l'essentiel de son menu ,
-Les poteaux creux des Telecom où elle se fait piéger en voulant y nicher,
-Les rongeurs empoisonnés dont elle se nourrit,
-Les abreuvoirs où elle se noie,
-Les poteaux meurtriers de l'EDF sur lesquels elle s'électrocute.

Portrait de la chouette-chevêche (En latin : Athene noctua.)

Elle est petite, ronde, tachetée dessus, avec des sourcils pâles. Son bec est crochu. Elle a les yeux noirs cerclés de jaune, placés devant : ce qui veut dire que c'est un rapace nocturne.

Elle est de petite taille (21cm), a un aspect trapu, avec une tête plate et un front bas qui lui donnent un air sévère; mais ce n'est qu'un air !... Le dessus de son corps est brun foncé tacheté et barré de blanc ; le dessous, blanchâtre, largement rayé de brun foncé.

C'est une des chouettes les plus faciles à observer : on peut même la voir en plein jour, perchée sur un piquet ou un poteau, en train de prendre un bain de soleil ! Pour un rapace nocturne, ce n'est pas banal !...



UNE POPULATION EN BAISSE

Malheureusement, à cause de tout ce qui la menace, la population de "Athene noctua", son nom latin, diminue chaque année, et il est plus qu'urgent de la sauver, sinon elle risque de disparaître de la planète Terre.

Les solutions existent : il suffit de les appliquer. Nous, nous avons décidé d'aller voir les agriculteurs pour leur proposer de replanter des arbres autour de leurs pâturages ; de plus, nous allons installer un nichoir spécial Chouette chevêche, dans un endroit propice ; enfin, nous allons replanter un frêne dans un terrain communal proche du bocage, et nous le taillerons régulièrement en têtard. Si chacun s'y met, l'espèce sera sauvée.

BAUDIN Renaud



Chouette chevêche, photographiee pour analyser sa nourriture

Cuibărire: Modesta si timida noastră ţărăncuţă cu ochii galbeni si ... cioc coroiat depune în cavitatea găsită 3-5 ouă de-un alb lucios. Acolo unde nu găseşte locuri de cuibărit, se instaleează cu plăcere în colivii artificiale. (Atenţie! Uşiţa de intrare trebuie să fie de 70 mm diametru)

Instalarea cuiburilor artificiale ptr. păsărea cu ochi de aur este un excelent mijloc de a-i veni în ajutor si a o proteja. Totusi ptr. ca aceste colivii să fie eficiente si să nu devină veritabile capcane, trebuie să ascultaţi câteva sfaturi:



D'après un dessin original d'Alexis NOVALHAT

- dimensiunile cuibului – indicate pe pagina următoare trebuie să fie bine respectate, mai ales în ceea ce priveste diametrul uşitei.
- ladita cuibului trebuie să fie instalată toamna într-un loc (biotop) favorabil (livadă cu arbori scorburosi cu locuri deschise, însorite, în care cucuveaua să găsească... masa pusă.
- să nu plasăm niciodată cuibul în apropierea unui drum (şosele) sau râu din cauză puilor care părăsesc cuibul înainte de a şti să zboare, si care pot muri deci omoriţi de maşini sau înecaţi.

ici mai jos trei momîi de cucuvez

- cuferaşul va fi suspendat pe o rezistentă orizontală ptr. a proteja ouăle sau puii de eventuali prădători (îndeosebi dihorul)
- este bine ca pe fundul adăpostului să se aşterne un strat de rumeguş sau de turbă.





Fiche technique de construction et d'installation d'un nichoir à Chouette chevêche

Installer des cavités de nidification artificielles pour la Chouette chevêche est un excellent moyen de lui venir en aide et de la protéger. Cependant, pour que ces nichoirs soient vraiment efficaces et ne deviennent pas de véritables pièges pour cette espèce, il convient de suivre attentivement les conseils suivants :

- les dimensions du nichoir indiquées au verso doivent être respectées, surtout en ce qui concerne le diamètre du trou de vol.

- le nichoir doit être installé à l'automne dans un biotope favorable (verger de plaine avec de vieux arbres, et si possible patûré).

- il ne doit jamais être placé à proximité immédiate d'une route ou d'une rivière ; ce qui présenterait un danger pour les jeunes chevêches qui quittent le nid avant même de savoir voler.

- il sera suspendu à une branche horizontale (voir photo au verso) , afin de protéger les jeunes d'éventuels prédateurs (notamment la Fouine) .

- il est indispensable de déposer une litière de tourbe ou de sciure dans le fond du nichoir.


- chaque hiver, la solidité et l'étanchéité du nichoir doivent être contrôlées et la litière remplacée.

- le nichoir ne doit en aucun cas être visité pendant la période de ponte et de couvaison, c'est-à-dire entre fin-mars et mi-juin.


• après cette période, les visites (au maximum une par semaine) se feront par beau temps, à la tombée de la nuit, soit directement par le trou d'envol, soit en soulevant le toit amovible du nichoir.

• l'observation, à distance raisonnable du nichoir, à l'aide de jumelles ou d'un téléscope est possible toute l'année. En faisant preuve de la plus grande discrétion, vous pourrez observer les allées et venues des adultes et peut-être même assister aux parades nuptiales ou à la première sortie d'un jeune.

Plans et dimensions du nichoir



Matériel:



Fond :
F_1 = 1 planche de 80 x 16 cm
F_2 = 1 planche de 80 x 14 cm

Toit :
T_1 = 1 planche de 105 x 24 cm
T_2 = 1 planche de 105 x 22 cm

Arrière :
A_1 = 1 planche de 14 x14 cm

Avant
A_2 = 1 planche de 14 x14 cm avec un trou centré de 7 cm de diamètre.

(Toutes les planches ont 2 cm d'épaisseur)

Suspension :
S_1 = 2 lattes de 125 x 4 x 4 cm
S_2 = fil électrique gainé

Fixation :
F = 4 crochets galvanisés qui fixeront le toit amovible (T_1, T_2) au fond (F_1, F_2)

Etanchéité :
E = le toit sera recouvert d'une tôle galvanisée ou d'un papier goudronné et le reste du nichoir sera badigeonné d'huile de vidange.

PROTECȚIE



- Protejați răpitoarele nocturne și locurile lor de cuibărit
- instalați cuiburi artificiale acolo unde acestea lipsesc (puteți face aceasta cu ajutorul asociațiilor de protecție a păsărilor)
- nu deranjați niciodată o cucuvea care clocește (în general primăvara din martie în mai
- lăsați câteva deschizături la cesă, grajd, șură etc și un ochi de geam la pod, o scîndurică sub planșeu, pentru a permite accesul păsărilor care ar vrea să cuibărească aici. Cu o asemenea „pisică" în pod vă asigur că în câteva luni nu veți mai avea nici o coadă de șoarece!
- Gospodăriți cu grijă mediile de viață din spațiul rural care au un echilibru fragil
  - păstrați, îngrijiți și plantați copaci și pomi fructiferi și sălcii ce prin tăierea repetată a crengilor formează în mod natural scorburi
  - nu tăiați copacii bătrâni și scorburoși - refugii, loc ptr. cuibărit și hrană ptr. diverse specii.
- Favorizați protecția zonelor împădurite, și a livezilor din zona voastră și prin alte acțiuni:
  - limitați utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor chimice în grădina și livada voastră (folosiți gunoiul de grajd, compostul și... chemați păsările!
  - consumați produse locale, nechimizate și fără conservanți (prune uscate, suc de mere, tuică etc) legate de menținerea livezilor... din bătrâni.
  - susțineți asociațiile care protejează răpitoarele nocturne și păsările în general.



FAMILIA „ATHENEI"


— noctua —

Familia zeitei cu ochi de aur, numită în mod savant fam. „Strigiformelor" cuprinde 24 de genuri și în jur de 162 de specii! Cea mai mică este Glaucidium minutissimum care cîntărește doar 50 de g., iar cea mai mare este Bufa europeană, care poate ajunge la... 4 kg. În Europa întîlnim 13 specii, iar la noi, în România vreo zece. Cel mai mare reprezentant al familiei (și campion european) este Bubo bubo, mare cît un curcan și cu două moțuri de pene, de o parte și de alta a capului. Trăiește în regiunile împădurite dar și în stîncării, mai ales în zonele carpatice. Are penajul căfeniu, cu pete mai închise (ceea ce face un amestec de pene albe, galbene și brune cu diferite ape. Vînează în amurg și noaptea, mai ales rozătoare, dar și unele păsări: potîrnichi, rațe, ciori. N.B. Vom reveni la Bufa mare, cu multe, multe detalii într-un nr. viitor.




Pe „Asio otus" adică ciuful de pădure l-ați cunoscut în nr. 0 al revistei noastre. Se pare că era cea mai frecventă, răpitoare nocturnă. În prezent, ca și celelalte rude ale sale, este din ce în ce mai rară. Aflată cuibărea în pîlcurile de păduri din toate regiunile joase ale țării, urcînd și pe văile rîurilor. Ciuful de pădure este sedentar la noi; în iernile aspre, multe exemplare nordice se adăugă populațiilor noastre sau trec

mai spre sud. Deocamdată atît. Vom re- veni. Să-i spunem împreună cu revista „LA HULOTTE" nr. 17: RESPECTELE NOASTRE D-LE DUCE !



Cel mai mic - ce talie și nu ca importanță - membru al familiei ducilor este ciuful pitic (Otus scops). Fac aici aluzie la numele franțuzec al acestor specii (Grand-duc ; moyen-duc și petit-duc) ptr. că ei sînt în adevăr stăpînii nocturni ai pădurii. Noi am propune să fie avansați la gra- dul de titlul de principi. Ciuful pitic apare doar în sezo- nul cald, fiind singura pasăre de pradă de noapte de la noi, care migrează, datorită hranei sale formate din insecte ... (iernează în regiunile Africii cen- trale). Stăpînește la perfecție arta ... camuflaju- lui, penajul imitînd perfect scoarța copacilor. Cui- bărește în scorburi și în cuiburile altor specii, în ruinele caselor. Este întîlnit în pădurile luminoase ale ținuturilor joase, precum și în luncile rîurilor. În prezent însă micul duce... se tot ... duce spre ținuturi mai primitoare !



Domnia sa este Huhurezul mic alias Strix aluco, patronul celebrei reviste ... „LA HULOTTE" - din care tocmai am extras cîteva imagini ~ Se întîlnește mai precis se întîlnea în toate pădu- rile din țară, îmbrăcat în două hăi- nuțe diferite: roșcată și brună. Își instalează cuibul în scor- buri și vi -




la hulotte

nează rozătoare și păsările mici ce dorm în copaci. Și despre acest zburător nocturn vom afla mult mai multe din nr. 25 al simpaticei → ... Dacă vi se pare că repetăm în mod prea obsesiv acest nume, vă mărturisim că doar vi se pare și că această colecție este singura bancă de date și imagini de care dispunem !

Să revenim însă la bufnițele noastre. și la cucuveica noastră. Alte neamuri noptatice îi sînt: ~~strige (Tyto alba)~~ dama albă cu fețe în formă de inimă, ciuful de cîmpie (Asio flammeus), ciuvică sau cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum), mezine familiei, huhurezul mare (Strix uralensis) și minunița (Aegolius funereus). Din păcate efectivul acestor populații (unele cu o localizare restrînsă) scade îngrijorător pe zi ce trece. Cauze ?!! Vînătoarea și împușcarea, mai bine zis braconajul ptr. că toate răpitoarele sînt protejate prin lege, exploatările forestiere, insecticidele, rozătoarele otrăvite și prostia omenească ce a contribuit din plin la dispariția acestor prădători ce n-au altă vină decît aceea că nu cîntă asemeni privighetorii !!

Povestea unor... cocoloașe





1.

Se știe că păsările n-au dinți și că în consecință ele își înghit hrana fără să o mestece. În general bufnițele, huhurezii și cucuvelele (+ strigea), înghit prada întreagă mai ales dacă mărimea acesteia nu necesită „tranșarea" sau smulgerea sumară a câtorva pene mai mari. Acumulate în pipotă, victimele sînt supuse acțiunii sucurilor digestive care dizolvă elementele esimilabile. Părul, penele, chitina, cheratina, oasele sînt expulzate, pe cioc. Nu fără efort pasărea „își aspiră" aceste resturi prin esofag, comprimate sub forma unor cocoloase compacte și alungite numite ... INGLUVII. Ele sînt eruicate afară după câteva ore de la digerarea prăzii și înainte de a înghiți o nouă hrană. În mod normal, în 24 de ore au loc 2 rejecții: una în timpul zilei și una noaptea. Ingluviile pot avea formă, mărime și culoare diferite în funcție de specie. Cele mai proaspete sînt umede, lucioase și negre; cele mai vechi se decolorează și devin gri. Ele nu au nici un miros și duretea conservării lor variază de la câteva zile (la cucuvea - nr. 3), la mai multe luni (la strigă nr. 1; la ciuf nr. 2. ori la bufă nr. 4), aceasta depinzînd și de constituția lor. După ore eliminării (zi sau noapte), epoca anului și natura prăzii, ingluviile acelorași specii pot avea mărime diferită.


2.


3.


4.

Vezi pag. următoare extrasă din = La Hulotte = !

Les pelotes des **RAPACES NOCTURNES** contiennent de très nombreux os en général tous bien conservés :

Pour bien les reconnaître, vérifiez un à un tous les éléments : taille (voir les calibres), forme des extrêmités, forme générale, couleur, solidité, sans oublier les signes particuliers et – très important – l'endroit où elles ont été trouvées.


LA CHEVÊCHE
~cucuvea~

Souvent arrondies à un bout, effilochées à l'autre

en hiver : poils et os de rongeurs


très peu solide

en été : de très nombreux fragments d'insectes et des morceaux de terre provenant des Lombrics.



CALIBRE CHEVÊCHE

★ ON LES TROUVE ASSEZ DIFFICILEMENT (PEU DE PELOTES A LA FOIS) DANS LES ARBRES CREUX (VERGERS), LES VIEILLES MAISONS, LES CARRIÈRES.



L'EFFRAIE
~strigè~

★ ON LES TROUVE TRÈS FACILEMENT EN QUANTITÉS DANS LES GRENIERS, EGLISES, RUINES, GRANGES, HANGARS, PIGEONNIERS, PARFOIS AUSSI TROUS D'ARBRES

pelote très solide

matériel ayant servi à la dissection des pelotes d'effraie


les deux extrêmités sont arrondies

forme générale ovale, globuleux, parfois même toute ronde.

couleur : à l'état sec gris sombre

à l'état frais noire, lisse comme vernie.


signe particulier : énormément de crânes de musaraignes



CALIBRE EFFRAIE


NOTRE PHOTO :

MÊME EN PASSANT DE LOIN, EN VOITURE, ON RECONNAÎT FACILEMENT LES ÉGLISES OÙ NICHENT DES EFFRAIES





LE MOYEN-DUC
ciuf de pădure




CALIBRE MOYEN-DUC


au moins un bout arrondi (parfois les deux)

couleur gris clair (moins foncé que la hulotte)

surface assez régulière

contient des crânes assez bien conservés





★ ON LES TROUVE : SOUVENT EN GRANDES QUANTITÉS DANS LES BOIS (NOTAMMENT LES BOIS DE CONIFÈRES) PARFOIS PLUS DE 100 PELOTES SOUS LE MÊME ARBRE. MAIS ON PEUT AUSSI TROUVER DES PELOTES DE MOYEN-DUC ISOLÉES. LE MOYEN-DUC NE FRÉQUENTE PAS LES HABITATIONS ET NE NICHE PAS DANS LES TROUS.

LA HULOTTE
~HUHUREA MIC~


au moins un bout effiloché (parfois les deux)

couleur gris foncé (plus foncé que chez le Moyen-duc)

surface très irrégulière

signe particulier : contient des crânes, presque toujours fracassés (La Hulotte tue ses proies d'un coup de bec sur la tête)





CALIBRE HULOTTE

★ ON LES TROUVE DIFFICILEMENT CAR, EN DEHORS DE LA PÉRIODE DE NIDIFICATION, LA HULOTTE N'EST PAS ATTACHÉE A UN COIN PRÉCIS : FORÊTS (SURTOUT LES ARBRES COUVERTS DE LIERRE), PARFOIS CLOCHERS, RUINES, CAVERNES, GRENIERS, GRANGES ISOLÉES

A SE CITI DE ORIZONTALA !



Trecem - din motive de spatiu peste capitolele: unde găsim ingluvii ?! și cum se formează ele, rolul lor etc', blă-blă-blă ... Vă spunem totuși că răpitoarele diurne își lasă 'rareori ingluviile într-un loc precis; în plus sucurile lor digestive foarte puternice, distrug aproape total resturile prăzii, încît este practic imposibil să afli ce-a mîncat uliul, de exemplu'! - vezi gogoloșul nr. 5). Ingluviile răpitoarelor nocturne sînt dimpotrivă depuse în locuri destul de precise, resturile prăzilor rămînînd usor identificabile, datorită sucurilor digestive mai puțin puternice.


(5)

Iată deci că interesul nostru față de aceste ... resturi alimentare - așa zice răuvoitorii! - este strict științific. Atunci ... să începem!


1. REGIM ALIMENTAR

Analiza conținutului ingluviilor pe o mare cantitate de exemplare și pe o perioadă destul de lungă, ne permite să determinăm cu precizie regimul alimentar al speciei studiate. Este posibil de asemenea să cunoaștem regimul alimentar al diferiților indivizi din aceeași specie, să comparăm, să obținem informații.

2. ANALIZA MICROFAUNEI


(6)

Specialiștii în ... microvertebrate, utilizează, printre alte mijloace, ingluviile ptr a studia aceste mici rozătoare cu comportament foarte discret (repartiție, densitatea populațiilor etc ...) În plus aceste analize duse pe mai mulți ani pot aduce și alte învățăminte; de exemplu, informații asupra unor fenomene naturale nonvizibile: populațiile de rozătoare sînt supuse unor fluctuații sezoniere - suprabundență, invazii.



3. TERITORIUL DE VÎNĂTOARE

Rezultatele analizei ingluviilor ne permit să facem investigații asupra „naturii" teritoriului de vînătoare al speciei considerate. În adevăr microvertebratele trăiesc în habitate foarte variate (grădini, pajisti umede, păduri, lunci, zone stîncoase) ceea ce permite reconstituirea, pt. o specie dată, a unui mozaic de locuri de vînătoare, definindu-l astfel pe cel preferat.

4. IMPORTANȚĂ ÎN ECONOMIA AGRICOLĂ

Răpitoarele, ce prădători specializați sînt „reguletori ai populațiilor de șoareci și reprezintă un ajutor prețios în agricultură. În acest caz examinarea ingluviilor permite să se facă anumite constatări asupra productivității suprafețelor agricole și-a stării de echilibru dintre „vînători" și „vînat".

5. INGLUVII FOSILE

În anumite regiuni au fost găsite ingluvii (sau resturi) foarte vechi. O analiză delicată a conținutului lor a furnizat prețioase informații asupra păsărilor, microvertebratelor și habitatelor vechilor epoci, permițînd înțelegerea unor mecanisme ale evoluției.

6. NOȚIUNEA DE LANȚ ALIMENTAR

Ingluviile sînt reprezentarea concretă a transferului de hrană, în ciclurile naturale (piramida trofică) permițînd cuantificarea unei noțiuni adesea abstracte și subiective.



Disecția ingluviilor...

[sau ce vom găsi în cocoloașe]

Disecția ingluviilor se poate face mai usor dacă acestea sînt umezite în apă, folosind o pensetă, un ac, o pensulă ptr. triere și apoi o lupă, o balanță, o riglă și un determinator ptr. identificarea dentiției și craniilor a diverse micromamifere. Numărul prăzilor găsite într-o ingluvie este variabil: 2-6, cînd capturările au talie mică (chițcani, șoricei) sau ½ dintr-o pradă mai mare (iepure, șobolan, pasăre mai mare). Natura resturilor găsite depinde deci de mărimea speciei capturate și de răpitoarea care a vînat. Deci vom găsi:


după...

- mamifere mici - acestea sînt principalii constituenți ai cocoloașelor mai ales, se identifică craniile și dinții, ptr. determinarea cutărui ordin, cutărei specii etc.

înainte de...



↑ Aveți în imaginea de mai jos un grup de ... chițcănei înainte și după întîlnirea cu minunita. Nu se poate spune că din ei nu a rămas nici o ... urmă. Dimpotrivă!




- pășări (de obicei de talie mică); se găsesc destul de des părți ale craniului, ciocul, tarsul cu gheare. Oasele sînt lățite și poroase, usor de le diferențiat de cele de mamifere. Cîteva pene pot fi adesea prezente dar identificarea lor este imposibilă



- batracieni, pești, reptile; ele sînt destul de rar prezente în ingluvii: se pot găsi cîteva oase subțiri, bucăți de piele cu solzi vertebrele, urostilul ori centura pelviană a unei broaște.






~ ce mai găsim ?!... (urmare)

- insecte, mai bine zis părțile lor chitinoase, uneori intacte permițând o identificare precisă: elitre de cărăbuș ori cărăbi, clești de rădaște ori urechelnițe s.a.

- resturi vegetale și minerale; păsările ciugulesc frecvent ierburi și fructe fie ptr a-și ameliora foamea, fie ptr. a-și spăla stomacul; de asemenea în ingluvii pot fi găsite pietricele, pământ, nisip, turbă înghițite cu scopul de a ajuta la măcinarea și mai bună digestie a prăzii.



. . . . . .



foto 1

Ați văzut deja (și n-ați văzut totul!) cât de captivant poate fi un... atelier de analiză a ingluviilor.

Cum vom procede ?! Nu-i deloc complicat!

- Vom măsura lungimea și diametrul ing.
- Vom separa și tria resturile identificabile: cranii, maxilare, oase caracteristice, solzi, chitină etc;
- Vom determina aceste elemente cu ajutorul cheilor de identificare
- Vom nota rezultatele

. . . . . .



foto 2

Acest exercițiu ne va conduce la înțelegerea noțiunii de lanț alimentar simplu: vegetal → rozător → răpitor.

Apoi, vom învăța mult mai multe despre rolul și protecția răpitoarelor, despre noțiunea de mediu, despre dentiția-ca adaptare la mediu (rozător ≠ insectivor), despre spectrul trofic al unor răpitoare

. . . . . .

Mini-test: ghiciți numele personajelor din cele 4 fotografii!



(foto 3)



foto 4



citeva... Reflecții

(așa cum îi stă bine unei zeițe a... înțelepciunii)

☺ Pagina ce vine este o filă dintr-un program de protecție și... observare a cucuvelei intitulat „A II-a noapte a cucuvelei", manifestare organizată de L.P.O (Liga pt. Protecția Păsărilor) și Parcurile naturale regionale din Franța. O adevărată sărbătoare la care au participat peste 30.000 de persoane. Cu tot optimismul de care dau dovadă sînt în stare, nu cred că voi vedea așa ceva în curînd sau auzi vreodată de-un asemenea festival la noi în... România.







☺ Ne-am permis să alăturăm numelor fr. și pe cele românești, adăugînd și cîte-o ilustrată a... peisajului în care vrem să locuim. Tot aici puteți privi și compara „talia" mea și-a prietenilor mei cu perie de cetinee.

☺ Mulțumiri naturaliste sincere celor care (ne)-au oferit informații și ilustrații despre mine și amicii mei cu zbor silențios. Să-i enumerăm (încercînd să nu uităm pe niciunul):



* 

- adică revista noastră de... inimă; îndeosebi nr. 17 a 25

* - dosarul: „Pour que vivent LES CHOUETTES CHEVÊCHES" - editat de C.P.N. ANTIROUILLE-BREST

* - dosarul „2ème Nuit de la Chouette" editat de L.P.O și Parcurile nat. din Franța.

* - revistei „La gazette du Pic Noir", dragei noastre prietene Agnès Piette și elevului ei Baudin Renaud

* Pe scurt merci à tous!

N.B. Lista cu adrese o găsiți la Aurelian Hoza secretarul clubului

2ème Nuit de la Chouette

Les chouettes et hiboux dans nos paysages

Cucuvele,bufnite sihuhurezi in...peisajul nostru

26 cm 

Chouette Chevêche
Cucuvea

38 cm 

Hibou Moyen-duc
Ciuf de pădure

21 cm 

Hibou Petit-duc
Ciuf pitic




Lisières, bouquets d'arbres, bocages, vergers, ...
Liziere,boschete, crînguri,livezi,...

---

38 cm 

Chouette Effraie
Striga



Clochers, granges, ...
Clopotnițe, suri și hambare,...

---

45 cm 

Chouette Hulotte
Huhurez mic

38 cm 

Hibou Moyen-duc
Ciuf de pădure



Futaies, grands arbres, ...
Cedrii,copaci bătrînî și scorburoși

---

72 cm 

Hibou Grand-duc
Buha



Zones rocheuses du centre et du sud de la France
Zone stîncoase, păduri și cedrii bătrînî


---

26 cm 

Chouette de Tengmalm
Minunița

16 cm 

Chouette Chevêchette
Ciuvica



Forêts et conifères dans les zones de moyenne et haute montagne
Păduri de foioase și de conifere din zona montană

---

40 cm 

Hibou des Marais
Ciuf de cîmpie




Marais et étangs
Mlaștini,lacuri, iazuri,lunci inundabile



Poșta Scatiilor

9

PLANET SOCIETY®
MEMBRE OFFICIEL



Luna octombrie si-a desfășurat zilele sub auguri din cei mai favorabili. Ca să nu leșinați ~ din cauza atîtor vești bune ~ să le luăm pe rînd.! Mai întîi, Yves, șeful clubului a primit „legitimația" de membru al Soc. Fr. de Odonatologie, chiar din partea președintelui J.L. Dommanget.

O știre senzațională a cutremurat, în modul pozitiv inimile cuminților SCATII. Începînd cu 14.10 sîntem ... PLANETARI adică membrii oficiali ai organizației PLANET SOCIETY®. Dosarul Gazetei Scatiilor internaționale de schimburi de idei, proiecte, cereri și oferte cu numeri naturaliste înscrise sub deviza „Un nou proiect de viață" (un nou mod de a trăi, e convietui, a te împrieteni cu lumea înconjurătoare). Cei neîncrezători pot vedea mai jos copia legitimației noastre ...

PLANET SOCIETY®

Membre Officiel

Nouveau Projet de Vie

PLANET SOCIETY • مجتمع الكوكب • SOCIETE PLANETAIRE • 环球社会 • SOCIEDAD PLANETARIA • ПЛАНЕТАРНОЕ ОБЩЕСТВО

Nom de l'Organisation **CLUB CPN ORNITHO - ROUMAIN "LES TARINS"**	N° de Membre **PRO ROM 002**
Nom du Projet **la gazette des tarins**	Date d'adhésion **14/10/98**
Coordonnées **ANIES 345** **4531 ANIES** **BISTRITA-NASAUD** **ROUMANIE**	Origine du contact **nsp**
Type d'organisation **Association / ONG locale**	

N.B.1. Așteptăm de-acum împlinirea unor speranțe.
N.B.2. Detalii despre „Planet Society" la adresa clubului.



Poștă...



Clubul → trimite revistei cu



din Luxemburg ne nr. 47 (3/98) al „PANEWIPPCHEN" superbe ilustrații postere, articole și concursuri. Mersi Pandă!




Din Avignon am primit noutăți și multă prietenie din partea unui înflăcărat și neobosit ornitolog... mersi Off Thierry!

. . . . . .



Ne-au mai scris trimițându-ne vești, reviste, fotografii și prietenie (scuzați bisul):

- d-l Florin Tonceanu președintele clubului C.P.N Torquilla din Sebeș - ALBA
- d-soara Carmen Goche, președinta filialei S.O.R Iași
- d-na profesoară Colgiu Rodica șefa grupului de cercetași „Licuricii" din București.
- d-l Laszlo Vasile Kalaber de la Fundația Nat. Darurile Carpaților - Reghin (filială S.O.R) ne-a invitat la conferința de herpesologie din acest oraș. D-l dr. HONORIS CAUSA LÁSZLO V. KALABER este reprezentantul României în Comitetul Internațional de Ornitologie. Ne pare extrem de rău că din cauze financiare nu am reușit să onorăm această invitație.



Cele două lucrări (una despre avifauna din zona Arieșului, a doua despre ingluvii) vor fi trimise prin poștă.

Tuturor mulțumiri; preaplecate salutări și cele mai curate gânduri neturaliste.

Așteptăm să ne scrieți.

~ Cu stimă, d-na nopții Athene noctua!



«HULOTTE»

ooo


ne [re]-prezintă numerele 12, 13 și 14.

Nr. 12 este un dosar - naturalist bineînțeles! - dedicat unei rude a cucuvelei, STRIGA, Tyto alba ptr. intimii familiei. Cee de-a doua parte se ocupă de pisica sălbatică și sălbaticii ei prieteni, vînătorii...






Nr. 13 cu toate că-i ghinionist se ocupă de libelule, lăstuni și drepnele. În articolul nostru „Frumoasa și bestia" - din nr. precedent am folosit multe imagini ale desprinse dintre peginile acestei reviste.




14 este un „special champignons"? Nu o consemnă cu ciuperci ci un documentar care ne învață cum să identificăm ciupercile, cele comestibile, inofensive sau toxice. Vă asigur că este un nr. delicios, bine codimentat cu sare, piper [citește desene umoristice!] dar și informații pertinente de micologie. Iată doar un mic desen drept dovadă



Cititi-l cu încredere-vi-l putem împrumuta și sîntem siguri că o să... MURIȚI de RÎS!





O... glumă



Nu-i de glumă ...

ATENȚIE !

Din neemul răpitoarelor nocturne, 21 de specii apar pe lista C.I.P.O. (Convenția Internațională de Protecție a Păsărilor) din care amintim: fodilă congoleză (Phodilus prigogenei, Ketupa (Ketupa blakistoni) și cucuvează pescar (Scotopelia ussheri). Ciuful de Flores (Otus alfredi) și strige galbenă (Tyto soumagnei) sînt se pare... stinse, dispărute definitiv!



Ciuhurez de pădure
Strix aluco

Au ciugulit de pe ici-colo și-au adunat eici în cuib puful ori grăunciorul lor de știință următorii pițigoi: Ives Aurelian, Cipni Daniel și alții

